

# Calendari quirúrgic en pediatria

Pedro Palazón Bellver

Facultatiu especialista Cirurgia pediàtrica

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

**XI Curs d'Actualització de Pediatria d'Atenció Primària SAP Esquerra.**



# PATOLOGIA del PENIS

## ADHERÈNCIES BALANOPREPUCIALS

- Retracció suau i contínua. NO tributàries de cirurgia.

## FIMOSI

- Puntiforme o cicatritzal o balanitis xeròtica: derivació urgent.
- Fimosi anular: derivació ordinària als 4 anys.
- Anell prepucial estret: control ambulatori - 2 mesos de corticoides i retraccions.

## FRE PENIS CURT

- Derivació a l'adolescència per a cirurgia amb anestèsia local.

## HIPOSPÀDIES

- Hipospàdies distal: derivació ordinària lactant.
- Hipospàdie perineal o proximal: derivació urgent per descartar intersexe o malaltia adrenal.

# PATOLOGIA TESTICULAR

## TESTES EN ASCENSOR

- Variant de la NORMALITAT. Si un teste arriba a bossa escrotal sense tensió, NO CAL CIRURGIA (encara que de vegades es situi a canal inguinal).

## TESTES MALDESCENDITS - CRIPTORQUIDIA

- Valoració als 6 mesos. Si no arriba a bossa escrotal, derivació ordinària per a IQ als 9-12 mesos.

## TESTES NO PALPABLES

- Unilateral: valoració als 6 mesos, si no es palpa derivació ordinària per a IQ als 12 mesos.
- Bilateral: valoració als 6 mesos per ENDOCRÍ.

## VARICOCEL

- Derivació si dolor crònic, disminució mida teste esquerra a ecografia o gran varicocele.

# **PATOLOGIA dels GENITALS EXTERNES FEMENINS**

## **SINÈQUIA LLAVIS MENORS VULVARIS**

- Alliberació a la consulta amb EMLA + Retracció posterior per evitar la sinèquia o crema estrogènica.

## **HIPERTRÒFIA LLAVIS MENORS VULVARIS**

- Derivació a cirurgia a l'adolescència. NO abans que recidiven.

# PATOLOGIA del CANAL INGUINAL

## HÈRNIA INGUINAL

- Lactant: derivació urgent per a IQ en 15 dies.
- Escolar: derivació ordinària al diagnòstic. No cal proves imatge.

## HIDROCEL

- Derivació ordinària als 2 anys si persisteix.

## QUIST de CORDÓ

- Derivació ordinària als 2 anys si persisteix.

# PATOLOGIA de la PARET ABDOMINAL

## HÈRNIA UMBILICAL

- Derivació ordinària als 4 anys.

## HÈRNIA SUPRAUMBILICAL

- Derivació ordinària als 4 anys.

## HÈRNIA EPIGÀSTRICA

- Derivació ordinària als 4 anys.

## DIÀSTASI DE RECTES

- Control ambulatori, millora amb l'edat.

# PATOLOGIA OROFACIAL

## ANQUILOGLÒSSIA

- Neonat o lactant: derivació preferent per secció a la consulta.
- Escolar: derivació ordinària si no millora amb logopèdia.

## FRE VESTIBULAR CURT

- Derivació ordinària quan la dentició definitiva i valorat per odontòleg.

## FÍSTULA PREAURICULAR

- Derivació ordinària al diagnòstic.

## MUCOCEL

- Derivació ordinària al diagnòstic.